Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică *M_pedagogic*
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2

Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	$0,1(6)=\frac{15}{90}=\frac{1}{6}$	**3p**
	$2\cdot\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)=2\cdot\frac{1}{2}=1$	**2p**
2.	$f(a)=2a-2$	**2p**
	$2a-2=a\Leftrightarrow a=2$	**3p**
3.	$x^2+6=5x\Leftrightarrow x^2-5x+6=0$	**3p**
	$x=2$ sau $x=3$	**2p**
4.	După prima ieftinire cu 10% , prețul obiectului este $900-10\%\cdot 900=810$ lei	**3p**
	După a doua ieftinire cu 10% , prețul obiectului este $810-10\%\cdot 810=729$ de lei	**2p**
5.	$AB=\sqrt{10}$, $AC=\sqrt{10}$, deci triunghiul ABC este isoscel	**3p**
	$BC=\sqrt{20}$, și cum $\left(\sqrt{20}\right)^2=\left(\sqrt{10}\right)^2+\left(\sqrt{10}\right)^2$, obținem că triunghiul ABC este dreptunghic	**2p**
6.	$\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$, $\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$	**3p**
	$\sin^2 30^\circ+\sin^2 45^\circ+\sin^2 60^\circ=\frac{1}{4}+\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$	**2p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.	$0*(-2)=2(0+(-2))+0\cdot(-2)+2=$	**3p**
	$=-4+2=-2$	**2p**
2.	$x*y=xy+2x+2y+4-2=$	**2p**
	$=x(y+2)+2(y+2)-2=(x+2)(y+2)-2$, pentru orice numere reale x și y	**3p**
3.	$x*(-1)=(x+2)(-1+2)-2=x+2-2=x$	**2p**
	$(-1)*x=(-1+2)(x+2)-2=x+2-2=x=x*(-1)$, pentru orice număr real x, deci $e=-1$ este elementul neutru al legii de compoziție „$*$”	**3p**
4.	$(x+3)(x+3)-2=2\Leftrightarrow x^2+6x+5=0$	**3p**
	$x=-5$ sau $x=-1$	**2p**
5.	$(\lg x+2)(\lg(2x)+2)-2=-2\Rightarrow \lg x+2=0$ sau $\lg(2x)+2=0$	**3p**
	$x=\frac{1}{100}$ sau $x=\frac{1}{200}$, care convin	**2p**
6.	$a*b\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow(a+2)(b+2)\in\mathbb{Z}$	**2p**
	De exemplu, pentru $a+2=\frac{2}{3}\Leftrightarrow a=-\frac{4}{3}\in\mathbb{Q}\setminus\mathbb{Z}$ și $b+2=\frac{3}{2}\Leftrightarrow b=-\frac{1}{2}\in\mathbb{Q}\setminus\mathbb{Z}$, obținem $a*b=-1$, care este număr întreg	**3p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.	$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}\Rightarrow \det A=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{vmatrix}=1\cdot 2-0\cdot 1=$	**3p**
	$=2-0=2$	**2p**
2.	$M(a)=a\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ 0 & 2a+1\end{pmatrix}$	**3p**
	$\det\left(M(a)\right)=\begin{vmatrix}a+1 & a\\ 0 & 2a+1\end{vmatrix}=(a+1)(2a+1)$, pentru orice număr real a	**2p**
3.	$M(-2)=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 0 & -3\end{pmatrix}\Rightarrow \det\left(M(-2)\right)=3$	**2p**
	$M^{-1}(-2)=\begin{pmatrix}-1 & \frac{2}{3}\\ 0 & -\frac{1}{3}\end{pmatrix}$	**3p**
4.	$M(1)\cdot M(2)=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 2\\ 0 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 9\\ 0 & 15\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}2 & 3\\ 0 & 5\end{pmatrix}$	**3p**
	$A\cdot A+I_2=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & 4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 0 & 5\end{pmatrix}$, deci $M(1)\cdot M(2)=3\left(A\cdot A+I_2\right)$	**2p**
5.	$M(a)-2aA=I_2-aA=M(-a)\Rightarrow \det\left(M(a)-2aA\right)=(1-a)(1-2a)$	**2p**
	$(1-a)(1-2a)=1\Leftrightarrow 2a^2-3a+1=1\Leftrightarrow a(2a-3)=0$, ceea ce este imposibil dacă a este număr întreg nenul, deci $\det\left(M(a)-2aA\right)\neq 1$, pentru orice număr întreg nenul a	**3p**
6.	$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -4\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}x+y=0\\ 2y=-4\end{cases}$	**2p**
	$x=2$ și $y=-2$, deci $X=\begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}$	**3p**